

GRAMA CU FORMULA LEUCOCITARA CU HB,HT,INDICI
 HEMOGRAMA CU FORMULA LEUCOCITARA CU HB,HT,INDICI
 HEMOGRAMA CU FORMULA LEUCOCITARA CU HB,HT,INDICI
 HEMOGRAMA CU FORMULA LEUCOCITARA CU HB,HT,INDICI
 PROTEINA C REACTIVA CRP
 URINA BIOCHIMIE
 URINA BIOCHIMIE

Hemoglobina eritrocitara medie HEM	26.9	9/27/2019	7:01
Hemoglobina Hb	9.1	9/27/2019	7:01
Largimea distributiei eritrocitare	15.2	9/27/2019	7:01
Largimea distributiei trombocitare	7.9	9/27/2019	7:01
CRP	6.24	9/27/2019	7:01
proteine	500	9/30/2019	1:31
glucoza	300	9/30/2019	1:31

Tratament efectuat

ACUPAN 20MG/2ML	6.00
ANXIAR 1 MG	7.00
BROMHEXIN MAGISTRA 8 MG	6.00
CEREBROLYSIN 10 ML	9.00
FRAXIPARINE 3800 UI / 0.4ML	1.00
HEPIFLOR - PROBIOTIC	10.00
PARACETAMOL 10 MG/ML - 100 ML	2.00
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM KABI 4G/0.5G 50 ML	20.00
SER FIZIOLOGIC 500 ML 0.9% - STADA	1.00
SER FIZIOLOGIC 0.9% 250 ML	14.00
SER FIZIOLOGIC- 1000 ML	2.00
SICOVIT B 1 100 MG/2 ML	13.00
SICOVIT B 6 250 MG/ 5 ML	13.00
THIOSSEN TURBO 600 MG / 50 ML	2.00
TRUSA TRANSFUZIE	14.00

Examen paraclinice:

EKG

ECO

Rx

Altele

Pacient diabetic, insulino-tratat, cunoscut cu patologii urologice si gastroenterologice, este in evidenta nefrologica din 2017. inclus in program cronic de supleere renala prin hemodializa.

Actualmente se adreseaza pt infectie de tract urinar cu Pseudomonas documentata anterior internarii.

Pacientul a fost sondat urinar, a fost evaluat urologic cu recomandare de suprimare sonda urinara la externare.

Se initiaza antibioterapie cu Piptaz cu evolutie clinico-biologica favorabila-urocultura negativa, CRP-2,5 mh/dl, ecografie renala fara UHN.

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

Tratament recomandat (in situatia in care la externarea din spital se elibereaza prescriptie medicala se va inscrie seria si numarul acesteia):

RECOMANDARI:

- regim hiposodat, hipoglucidic,
- continua sedintele de hemodializa 2/sapt cu reevaluare functie renala in dinamica,
- continua tt cu Debridat 200 mgx2/zi, Aspenter 75 mg/zi, Piracetam 2tb/zi, Siranalen 2tb/zi, Anxiar 00,5 mg 1cp/seara,
- evaluare urologica cf programarii, *Telexin 1 cp 1x - 14 zile; Anodart 2 tb 1x - 1 luna.*
- dispensarizare diabetologica si insulino-terapie,
- dispensarizare nefrologica periodica.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate